



Größe/n Ø	cm	
Form	rund, rundlich, unregelmäßig rundlich, knollig, blasig geöffnet, secotiod	
Peridie Farbe	weißlich, gelblich, ockerlich, bräunlich, schwarz	
Farbveränderung nach Entnahme	so bleibend, gilbend, blauend, rötend, bräunend, schwärzend	
Peridie - Oberfläche	glatt, rauh, feinkörnig, feinwarzig, grobwarzig, mit Rhizomorphen, Mycelreste, aufgerissen, abgeblättert	
Peridie	Stärke/Dicke in mm	
Peridie Bauart	einfach, doppelt	
Gleba	mit/ohne Kolumella, trocken, schleimig, feinadrig, aderig, pulverig grobadrig, marmoriert, hohl - gekammert, labyrinthisch gekammert,	
Gleba	Farbe , Konsistenz	
Geruch/Geschmack	stinkend, aasartig, angenehm, intensiv, pilzig, würzig, fruchtig, flüchtig, asphaltartig, acetonartig, rauchig, honigartig,	
Peridie Textura	globulosa, intricata, prismatica, oblita, porrecta	
Hyphen	septiert, unseptiert , zylindrisch, angeschwollen, mit Schnallen	
Hyphen	gabelig, septiert, zweifach, vierfach	
Ascus Form	ballonartig – sackartig – rundlich – langgezogen zylindrisch	
Ascus-Größe	Länge x Breite in µm	
Sporenanzahl:	Anzahl von - bis	
Sporenform/-größe	rund, rundlich, oval, elliptisch, lang elliptisch, zitronenförmig, mit Appendix (Apiculus), Doppelappendix, Apiculus mit/ohne Kragen, mit/ohne Papille	
Sporengröße reifer Sporen	Länge x Breite in µm	
Sporenoberfläche	glatt, feinwarzig, warzig, streifig, grobwarzig, feinstachelig, grobstachelig, mit grober	
Netzzeichnung	Anzahl = Lg + Br), feinmaschig (Anzahl= Lg +Br) mit Sacculus	
Sporenfarbe	hyalin, hell, gelblich, braun, schwarz, dunkel	

Belegsicherung/Bildmaterial/Aufbewahrung

Zeichnung: Fruchtkörper, Ascus/Basidie mit Sporen, Paraphysen, einzelne reife Spore (in Hühnereigröße): _____ Bilder/Fotos: _____

1. Fundort weiträumig : _____ 2. Frkp. Peridie/Gleba: _____
 3. Mikraufnahme mit Sporenbild: _____ 4. ggf. Videosequenz: _____

Aufbewahrung: getrocknet/Alkohol: _____

Versiegelter Objektträger: _____

Aufbewahrungsnummer: _____

Finder/Sammler (legit): _____

Bestimmer (determinavit): _____

